



## Lecicarbon® bekommt ein neues Gesicht!



- ★ Sicherer Wirkungseintritt nach 15–30 Minuten
- ★ Natürliches Wirkprinzip
- ★ Einfache Anwendung – sauberes Ergebnis
- ★ Keine Gewöhnung
- ★ Ohne Nebenwirkungen

### Lecicarbon® – Leistung mit Tradition

Getreu dem Motto: „Ich kann, wann ich will“ bietet Lecicarbon® seit nahezu 80 Jahren und auch weiterhin eine „5-Sterne-Therapie“ bei Verstopfung:


- ★ **Schnell** nach 15–30 Minuten, weil Lecicarbon® direkt am Ort des Geschehens im Enddarm ansetzt und sofort den Abführreflex anregt
- ★ **Nebenwirkungsfrei**, weil Lecicarbon® natürliches Kohlendioxid entwickelt, das ohnehin im Darm für den Entleerungsreflex mit verantwortlich ist
- ★ **Schonend**, weil Lecicarbon® exakt die natürliche Darmtätigkeit nachahmt, ohne den Körper und das Kreislaufsystem zu belasten
- ★ **Ohne Gewöhnung**, auch nicht bei Langzeiteinnahme, weil Lecicarbon® die normalen Darmreflexe reaktiviert
- ★ **Sauber**, weil Lecicarbon® mit natürlichem Kohlendioxid die körpereigene Peristaltik in Schwung bringt – ohne Nachkleckern, ohne Schmierer

### Die „5 Sterne Therapie“ gegen Verstopfung in neuem Design

Nach vielen Jahren im bewährten „Outfit“ wird das Erscheinungsbild dieses traditionsreichen Abführmittels jetzt ein wenig überarbeitet. Der Schriftzug aus den 70er-Jahren wird leichter und eleganter gestaltet, die Verpackung erhält eine luftige, moderne Anmutung. Ab Mitte dieses Jahres werden die

neu gestalteten Verpackungen in Ihrer Apotheke zu erhalten sein. Unverändert geblieben ist natürlich die Fülle von Produktvorteilen, die Lecicarbon® zur schonenden Problemlösung bei einer Vielzahl von Verstopfungsleiden macht.

### Lecicarbon® – das genial einfache Wirkprinzip



Das Kohlendioxid wird freigesetzt. Die Darmmuskulatur wird sanft massiert...

... und löst den Entleerungsreflex im Enddarm nach 15 bis 30 Minuten aus.

1 Lecicarbon® - Zäpfchen entwickeln im Enddarm feinerlige Mikrobläschen aus Kohlendioxid.

2 Diese „Microbubbles“ dehnen behutsam die Darmwand.

3 Die Darmperistaltik wird aktiviert und der Entleerungsreflex sicher nach 15 bis 30 Minuten ausgelöst – ohne Nebenwirkungen, ohne Gewöhnung, auch nicht bei Langzeiteinnahme.

„Schneller befreit – Zeit für anderes!“

### IMPRESSUM / Kontakt

athenstaedt GmbH & Co KG  
Bahnhofstraße 11, 82515 Wolfratshausen  
Tel.: +49 8171 386 25-0,  
Internet: [www.athenstaedt.de](http://www.athenstaedt.de)  
E-Mail: [pharma@athenstaedt.de](mailto:pharma@athenstaedt.de)

U-St. Ident-Nr. DE 114 521 354,  
athenstaedt GmbH & Co KG, HRA München 78244,  
athenstaedt group gmbh, HRB München 170361,  
Geschäftsführer:  
Stefanie E. Sponholz, Thorsten Sponholz  
Aufsichtsbehörde: Regierung Oberbayern.

Anstatt chemisch in die Darmtätigkeit einzugreifen, wirkt das Kohlendioxid mechanisch auf die Darmwand ein, mit der Folge, dass sowohl Nebenwirkungen als auch Gewöhnungseffekte bei diesem Laxans nicht bekannt sind.

Als Zäpfchen wirkt Lecicarbon® unmittelbar am Ort des Geschehens. Der Magen wird geschont, das Gesamtsystem wird nicht belastet.

Ob bei gelegentlicher oder chronischer Verstopfung, Verstopfung bei Handicap, Verstopfung als Folge von chronischen Grunderkrankungen oder Verstopfung durch Schmerz- oder Krebstherapie bietet Lecicarbon® immer noch das genial einfache Wirkprinzip gegen Verstopfung.

**Bestellen Sie jetzt Informationsmaterial »**

# Lecicarbon® NEWSLETTER

Der Newsletter zum Thema **Obstipation**


Ausgabe 1 | 2013

## Informationsmaterial – bestellen Sie kostenfrei per Fax oder per Post:

athenstaedt, Bahnhofstraße 11, 82515 Wolfratshausen, Fax-Bestellnummer: 08171 38625-15



- |  |             |   |             |
|--|-------------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> Ratgeber „Gelegentlich verstopft?“    | _____ Stück | <input type="checkbox"/> Ratgeber „Multiple Sklerose und Verstopfung“ | _____ Stück |
| <input type="checkbox"/> Ratgeber „Häufig verstopft?“          | _____ Stück | <input type="checkbox"/> Ratgeber „Morbus Parkinson und Verstopfung“  | _____ Stück |
| <input type="checkbox"/> Ratgeber „Handicap und Verstopfung“   | _____ Stück | <input type="checkbox"/> Ratgeber „Schmerztherapie und Verstopfung“   | _____ Stück |
| <input type="checkbox"/> Ratgeber „Diabetes und Verstopfung“   | _____ Stück | <input type="checkbox"/> Ratgeber „Schlaganfall und Verstopfung“      | _____ Stück |
| <input type="checkbox"/> Ratgeber „Adipositas und Verstopfung“ | _____ Stück | <input type="checkbox"/> Ratgeber „Krebstherapie und Verstopfung“     | _____ Stück |



- |  |             |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Broschüre „Wirkprinzipien im Vergleich“ | _____ Stück |
| <input type="checkbox"/> Allgemeiner Flyer                       | _____ Stück |
| <input type="checkbox"/> CD „Lecicarbon® - das Wirkprinzip“      | _____ Stück |

### Bitte schicken Sie die Unterlagen an:

\_\_\_\_\_

Selbsthilfegruppe

\_\_\_\_\_

Kontaktperson

\_\_\_\_\_

Straße

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort

## Guter Rat bei Verstopfung – wir kommen jetzt auch persönlich zu Ihnen!

Wir besuchen Ihre Selbsthilfegruppe und stellen das Wirkprinzip von Lecicarbon® persönlich vor – natürlich kostenlos. Wir zeigen anschauliches Bildmaterial, berichten von unseren Erfahrungen und beantworten Ihre Fragen.

### Haben Sie Interesse?

Dann nennen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten, wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf.

- Ja, wir haben Interesse an Ihrem Besuchsservice:

Selbsthilfegruppe: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

### Lecicarbon® E / K / S CO<sub>2</sub>-Laxans

Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: Natriumhydrogencarbonat 500 mg / 250 mg / 125 mg, Natriumdihydrogenphosphat 680 mg / 340 mg / 170 mg. Sonst. Bestandteile: Hartfett, (3-sn-Phosphatidyl)-cholin (aus Sojabohnen), hochdisperses Siliciumdioxid. Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei verschiedenen Ursachen der Obstipation, z. B. bei schlackenarmer Kost oder mangelnder Bewegung sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Defäkation erfordern. Zur Darmentleerung bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen im Enddarmbereich. Lecicarbon® kann auch zusätzlich angewendet werden, wenn vorher andere Abführmittel erfolglos genommen wurden. Gegenanzeigen: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Darmverschluss (Ileus) und bei Megakolon (krankhafte Enddarterweiterungen aus unterschiedlichen Ursachen); insbesondere bei Kindern und Säuglingen für alle Erkrankungen im Anal- und Rektalbereich, bei denen die Gefahr des übermäßigen Übertritts von Kohlendioxid in die Blutbahn besteht; bei Überempfindlichkeit gegenüber Soja, Erdnuss oder einem der sonstigen Bestandteile von Lecicarbon® CO<sub>2</sub>-Laxans. Lecicarbon® CO<sub>2</sub>-Laxans darf in der Schwangerschaft nach Rücksprache mit dem Arzt und in der Stillzeit angewendet werden. Nebenwirkungen: (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Sojalecithin) kann sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen. Hinweis: In seltenen Fällen kann das Einführen des Zäpfchens ein leichtes, schnell abklingendes Brennen verursachen. Sollten bei der Anwendung Nebenwirkungen auftreten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

athenstaedt D - 82515 Wolfratshausen